

AESCIN tabl.dojelitowe * 30 imp.równ. DELFARMA

Cena: 12,42 zł



Opis produktu

Aescin 20 mg tabletki dojelitowe
Escinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Co to jest Aescin i jakie ma działanie?

Aescin to preparat zawierający escynę, która działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Aescin to lek o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwobrzękowych, który poprawia kondycję ścian naczyń krwionośnych. Produkt stosowany jest w leczeniu żylaków, hemoroidów, zapalenia żył kończyn dolnych, krwaków i obrzęków pourazowych oraz pooperacyjnych.

W preparacie Aescin znajduje się substancja czynna escyna pochodząca z nasion kasztanowca. Substancja ta efektywnie zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, a także ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Lek szybko zmniejsza odczyn zapalny i obrzęk oraz przyspiesza wchłanianie krwaków pourazowych i pooperacyjnych.

Stosowanie leku Aescin jest zalecane:

- w leczeniu zmian pourazowych, takich jak stłuczenia, zmiężdżenia, zwichnięcia i obrzęki,
- w leczeniu żylaków i zaburzeń krążenia kończyn dolnych,
- w leczeniu żylaków odbytu,
- w profilaktyce zakrzepowego zapalenia żył.

Wskazania do stosowania Aescin:

Leczenie przewlekłej niewydolności żyłnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu.

Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych.

Profilaktyka i leczenie krwaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Skład:

Substancją czynną leku jest alfa-escyna.

Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian. Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110), silikonowa emulsja przeciwpienna.

Dawkowanie:

Aescin przyjmuje się doustnie.

Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.

Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.

W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfaescyny.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. lat.

Przeciwwskazania do stosowania:

Leku Aescin nie należy stosować u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami nerek, zagrażającymi ich niewydolnością oraz u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Zawartość:

30 tabletek powlekanych

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Jeżeli po zastosowaniu leku Aescin u pacjenta wystąpią poniższe objawy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

- zapalenie skóry
- zapalenie zakrzepowe żył
- podskórne stwardnienia (grudki pod skórą)
- wrzody skórne
- ostry ból związany z dolegliwościami skórnymi
- nagły obrzęk jednej lub obu nóg
- niewydolność serca lub nerek.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych należy często kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

Podczas stosowania leku Aescin należy kontrolować czynność nerek.

Uwaga! Stosowanie leku Aescin nie zastępuje innych środków zapobiegawczych takich jak okłady z zimnej wody lub noszenie uciskowych pończoch.

Interakcje z innymi lekami:

Aescin może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Niektóre antybiotyki – cefalosporyny mogą nasilać działanie leku.

Należy unikać jednoczesnego podawania leku Aescin z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na możliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów na nerki.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, Aescin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko:

Alergiczne zapalenie skóry (świąd, wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka).

Bardzo rzadko:

Ciężkie reakcje alergiczne (w niektórych przypadkach z krwawieniem); tachykardia, nadciśnienie tętnicze; reakcje nadwrażliwości; krwotok z dróg rodnych.

Niezbyt często:

Zawroty głowy, ból głowy; nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku.

Numer pozwolenia: 929/12

Importer równoległy:

Delfarma Sp. z o.o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111

91-222 Łódź

Dowiedz się więcej o imporcie równoległym.