

ALOPEXY 5% r-r na skórę 3x60ml

Cena: 93,12 zł



Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Alopexy to produkt leczniczy pobudzający wzrost włosów zalecany w pewnych przypadkach łysienia androgenowego o umiarkowanym nasileniu u mężczyzn.

Lek można dozować za pomocą dołączonego do opakowania aplikatora lub pipetki.

Skład

Substancją czynną leku jest minoksydyl.

1 ml roztworu zawiera 50 mg minoksydylu.

Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Alopexy przeznaczone jest do stosowania zewnętrznego, podanie na skórę.

Zaleconą dawkę 1 ml roztworu Alopexy nanosi się na leczonej powierzchnię skóry owłosionej głowy dwa razy na dobę. Lek odmierzamy załączoną pipetką dozującą, która pomaga precyzyjnie nanieść 1 ml roztworu na całą leczonej powierzchnię. Jeżeli podajemy lek na małą powierzchnię skóry możemy użyć załączony aplikator. 1ml roztworu odpowiada 6 naciśnięciom pompki. Po każdorazowym użyciu zarówno pipetki jak i aplikatora należy je przemyć ciepłą wodą.

Dawka dobową nie powinna przekraczać 2 ml roztworu niezależnie od leczonej powierzchni skóry.

Przed i po nałożeniu roztworu na skórę głowy należy dokładnie umyć ręce.

Przed zastosowaniem leku na skórę głowy włosy i owłosiona skóra głowy należy dokładnie wysuszyć.

Produkt leczniczy наносimy koniuszkami palców na całą leczonej powierzchnię skóry, zaczynając od środka leczonej powierzchni.

Działanie

Alopexy pobudza wzrost włosów u pewnej grupy pacjentów z łysieniem androgenowym. Występuje ono po około 2 miesiącach stosowania produktu i jest ono osobniczo zmienne. Odrost włosów zatrzymuje się po przerwaniu leczenia i po około 3-4 miesiącach wraca do stanu początkowego.

Wskazania

Alopexy stosowane jest w łysieniu typu męskiego o umiarkowanym nasileniu.

Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Alopexy nie należy stosować:

- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na substancję czynną (minoksydył) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent źle tolerował 2% roztwór minoksydyłu;
- jeśli u pacjenta występują uszkodzenia skóry owłosionej głowy.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie produktu leczniczego Alopexy należy natychmiast przerwać i skontaktować się z lekarzem:

- gdy wystąpi obniżenie ciśnienia krwi, ból w klatce piersiowej, przyspieszone tętno;
- w przypadku omdleń lub zawrotów głowy;
- jeśli wystąpi nagłe, niespodziewane zwiększenie masy ciała, opuchnięcie rąk lub stóp (obrzęk);
- w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia lub podrażnienia owłosionej skóry głowy.

Podczas stosowania produktu leczniczego Alopexy mogą wystąpić działania niepożądane. Do działań występujących bardzo często należą: nadmierne owłosienie w miejscach gdzie nie stosowano leku, zwłaszcza u kobiet oraz bóle głowy. Występujące często to: miejscowe reakcje skórne (miejscowe podrażnienie ze złuszczeniem naskórka, świąd, zaczerwienienie skóry, zapalenie skóry, suchość skóry, wysypka), bóle mięśniowo-szkieletowe, obrzęki obwodowe, ból w miejscu podania, trudności z oddychaniem, a także depresja. Występują także działania niepożądane o nieznanym częstości, takie jak: infekcje ucha, zapalenie ucha zewnętrznego, nieżyt nosa, nadwrażliwość, zapalenie nerwu, uczucie mrowienia, zaburzenia smaku, uczucie pieczenia, zaburzenia widzenia, podrażnienie oka, zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, ból w klatce piersiowej, osłabienie, obrzęk twarzy, rumień, wysypka, wypadanie włosów, nierównomierne owłosienie ciała, zmiana koloru włosów, zmiana tekstury włosów, zapalenie wątroby i kamica nerkowa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alopexy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet ze względu na częste występowanie nadmiernego owłosienia poza miejscami jego stosowania.

Gdy u pacjenta występowała lub występuje obecnie choroba układu krążenia lub zaburzenia rytmu serca, przed zastosowaniem leku Alopexy należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u krewnych pacjenta nie występuje wypadanie włosów, wypadanie włosów jest nagłe i (lub) częściowe, wypadanie włosów wystąpiło w wyniku porodu lub przyczyna wypadania 2 włosów nie jest znana. W tych przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli skóra owłosionej głowy jest czerwona, występuje stan zapalny skóry, infekcja, podrażnienie lub ból. Ten lek powinien być stosowany na zdrową skórę głowy. Jeżeli skóra owłosiona głowy jest uszkodzona, do krwi mogą przenikać zwiększone ilości substancji czynnej- minoksydylu.

Nie stosować tego leku w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi na skórę głowy.

Lek zawiera etanol (alkohol) i może powodować uczucie pieczenia i podrażnienie po przypadkowym dostaniu się do oczu, ran, na podrażnioną skórę lub błony śluzowe: podrażnione miejsca należy dokładnie przemyć bieżącą, zimną wodą. W razie utrzymującego się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

Nie wystawiać leczonej skóry głowy na słońce: należy nosić nakrycie głowy (kapelusz).

Nie połykać. W razie połknięcia leku należy skontaktować się z lekarzem. Przypadkowe spożycie może spowodować wystąpienie objawów wynikających z działania minoksydylu na układ sercowo-naczyniowy. Dlatego lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie wdychać rozpylanego leku.

U niektórych pacjentów wystąpiły zmiany koloru włosów i (lub) ich tekstury.

Każda dawka leku Alopexy zawiera 240 mg glikolu propylenowego, co odpowiada 240 mg glikolu 3 propylenowego w 1 ml roztworu.

Stosowanie innych leków

Nie należy stosować tego leku równocześnie z innymi lekami dermatologicznymi zawierającymi tretynoinę, antralinę czy dipropionian betametazonu, ponieważ leki te mogą zmieniać ilość minoksydylu znajdującego się we krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować - również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego produktu leczniczego w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować, gdyż nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.

Producent

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE