

ALTAZIAJA 1% żel - 75g

Cena: 6,68 zł



Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Opis

Altazija to produkt leczniczy o działaniu przeciwobrzękowym i ściągającym do stosowania w obrzękach (pourazowych, stawowych, po oparzeniach I° stopnia) i stłuczeniach.

Skład

Substancją czynną jest: glinu octanowinian (*Aluminii acetotartras*).

1 gram żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.

Substancje pomocnicze: mentol, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, karbomer, trietanolamina, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania zewnętrznego, miejscowego.

Dzieci od 3 roku życia i dorośli: 3-4 razy na dobę należy nanosić niewielką ilość żelu, najlepiej w postaci okładów.

Działanie

Altazija wykazuje działanie przeciwobrzękowe i ściągające, łagodzi ból i chłodzi w miejscu aplikacji ze względu na zawartość mentolu.

Wskazania

Produkt leczniczy **Altazija** stosuje się w obrzękach i stłuczeniach wynikających z urazu, obrzękach stawowych i obrzękach towarzyszących oparzeniu I stopnia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku **Altazija**:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- na otwarte, rozległe rany,
- na zakażoną skórę,
- na zmienioną chorobowo skórę,
- u dzieci do lat 3.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- miejscowe reakcje skórne,
- maceracja skóry,
- odczyny rumieniowe, grudkowe, ziarninowe (u osób nadwrażliwych),
- hiperaluminemia, hipofosfatemia (dotyczy pacjentów z ciężką niewydolnością nerek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Podczas stosowania leku **Altazija** należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Lek zawiera E 214 - parahydroksybenzoesan etylu - reakcja alergiczna, także typu późnego.
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować

się z lekarzem.

Inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Producent

ZIAJA
Jesienna 9
Gdańsk