

AMIZEPIN 200mg * 50 tabl."

Cena: 14,31 zł

Opis produktu

Amizepin to lek przeciwpadaczkowy (przeciwdrgawkowy). Lek Amizepin stosowany jest w niektórych bólach i zaburzeniach nastroju - tabletki te stosowane są w leczeniu takich chorób jak: padaczka, neuralgia, CHAD (choroba afektywna dwubiegunowa).

Skład

Substancją czynną jest karbamazepina.

1 tabletkę zawiera 200 mg karbamazepiny.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Amizepin stosuje się doustnie. Dawka, schemat dawkowania zależy od choroby, na którą ten lek został przepisany, a także wieku (lek stosowany jest u dzieci, młodzieży, osób dorosłych).

W razie konieczności tabletkę można dzielić.

Działanie

Amizepin zawiera karbamazepinę - wykazuje ona działanie przeciwpadaczkowe, zmniejsza niektóre zaburzenia nastroju i ból (np. w przypadku neuralgii nerwu trójdzielnego).

Wskazania

Amizepin stosuje się w padaczce, chorobach neurologicznych (np. neuralgia nerwu trójdzielnego), CHAD (w celu zmniejszenia występujących po sobie epizodów (hipo)manii / depresji).

Przeciwwskazania

Leku tego nie stosuje się jeśli u Pacjenta występuje nadwrażliwość na karbamazepinę, inne leki podobne (TLPD - amitryptylina np.), którąkolwiek z substancji pomocniczych. Niektóre choroby stanowią p/wskazanie do stosowania, należy wymienić tutaj: porfirię, blok przedsionkowo-komorowy serca, niektóre choroby krwi (zaburzenia czynności szpiku, ciężka niedokrwistość, inna choroba krwi o ciężkim przebiegu). Amizepin (karbamazepina) nie powinna być stosowana z niektórymi lekami jak inhibitory MAO (monoaminooksydazy), np. selegilina, moklobemid.

Działania niepożądane

Stosowanie tego leku może wiązać się z występowaniem skutków ubocznych - nie wystąpią one jednak u wszystkich stosujących Amizepin.

W postaci tabeli zebrano niektóre skutki uboczne - pełna lista znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Bardzo często	zawroty głowy, senność, zaburzenia koordynacji, nudności, zmęczenie, zmiany wskaźników wątrobowych
Często	trombocytopenia, obrzęki, wzrost masy ciała, ból głowy, suchość w ustach, niewyraźne widzenie
Niezbyt często	drżenie, oczopląs, zaparcia/biegunka
Rzadko	reakcje alergiczne, nocne poty, chudnięcie, bóle stawów, pobudzenie, dezorientacja, ból brzucha, osłabienie mięśni
Bardzo rzadko	zaburzenia smaku, opuchnięcie oczu, dzwonienie w uszach, szum uszny, zmiany pigmentacyjne skór
Częstość nieznana	zahamowanie czynności szpiku, ciężkie reakcje skórne, spadek gęstości kości

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niektóre choroby mogą stanowić ograniczenie lub dodatkowy środek ostrożności u pacjentów stosujących Amizepin, można wymienić tutaj m.in.: choroby krwi, nadwrażliwość na leki podobne do okskarbazepiny, problemy z funkcjonowaniem nerek, jaskra, psychoza, niedoczynność tarczycy.

W trakcie stosowania tego leku odnotowano ciężkie reakcje skórne, wysypki skórne. W przypadku wystąpienia objawów skórnych należy poinformować o tym lekarza.

Karbamazepina wchodzi w interakcje z niektórymi pokarmami jak grejpfrut, sok grejpfrutowy i jego przetwory - należy unikać tego połączenia. Lek ten zmniejsza tolerancję alkoholu.

Stosowanie innych leków

Amizepin może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, istotne jest poinformowanie lekarza o lekach stosowanych lub planowanych.

Amizepin wchodzi w interakcje z opioidowymi lekami p/bólowymi (tramadol, buprenorfina), SSRI, innymi lekami p/depresyjnymi (buspiron, mianseryna, amitryptylina), lekami p/grzybiczymi (flukonazol, ketokonazol), lekami p/wirusowymi (rytonawir, indynawir), alprazolamem, tadalafil, lewotyroksyną.

Amizepin wchodzi w interakcje z dziurawcem - jego ziele.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek ten może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, podczas stosowania tego leku mogą wystąpić np. senność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy podejmować wykonywania czynności wymagających zwiększonej uwagi.

Cechy produktu

- Płeć
 - Mężczyzna
 - Kobieta
- Wiek
 - dla dzieci
 - dla młodzieży
 - dla dorosłych
 - dla seniorów
- Typ produktu
 - Lek na receptę
- Postać
 - tabletki
- Problem
 - padaczka
- Układy narządowe
 - układ nerwowy

