

AMPRIL 5mg * 30 tabl.

Cena: 9,30 zł

Opis produktu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ampril 2,5 mg tabletki

Ampril 5 mg tabletki

Ampril 10 mg tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Ampril i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ampril
3. Jak stosować lek Ampril
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ampril
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ampril i w jakim celu się go stosuje

Ampril zawiera substancję czynną - ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Ampril działa poprzez:

- zmniejszanie wytwarzania w organizmie substancji mogących zwiększać ciśnienie tętnicze,
- zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych,
- ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie.

Ampril może być stosowany:

- w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego),

- w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu,
- w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy),
- w leczeniu serca, jeżeli nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca),
- w leczeniu po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ampril

Kiedy nie stosować leku Ampril:

- Jeżeli pacjent ma uczulenie na ramipryl, którykolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.
 - Jeżeli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świst, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.
 - Jeżeli pacjent poddawany jest dializoterapii lub innym zabiegom filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Ampril może nie być odpowiednim lekiem.
 - Jeżeli u pacjenta stwierdzono zaburzenia dotyczące nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).
 - Podczas ostatnich 6. miesięcy ciąży (patrz punkt poniżej „Ciąża i karmienie piersią”).
 - Jeżeli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz dokona oceny ciśnienia tętniczego.
 - Jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.
 - Jeżeli pacjent przyjmuje lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą w miejscach takich, jak gardło).
- Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Ampril. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ampril należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ampril należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą jeżeli:

- u pacjenta występuje choroby serca, wątroby lub nerek;
- pacjent niedawno utracił znaczną ilość elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, większej niż zwykle potliwości, stosowania diety zawierającej małą ilość soli, przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) przez dłuższy czas lub dializoterapii);
- planowane jest leczenie zmniejszające alergie na jad pszczoły lub os (leczenie odczulające);
- planowane jest podanie leków znieczulających. Mogą być one stosowane w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Ampril na dzień przed zabiegiem - należy skontaktować się z lekarzem.
- u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (widoczne w wynikach badań krwi);
- pacjent przyjmuje leki lub występuje u niego stany, które mogą obniżyć stężenie sodu we krwi.

Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

- pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (szybki obrzęk podskórny w okolicy takiej jak gardło) zwiększa się:
- racekadotryl, lek stosowany w leczeniu biegunki,
- temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do klasy inhibitorów Mtor (stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów oraz w leczeniu raka),
- wildagliptyn, lek stosowany w leczeniu cukrzycy.
- u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy;
- pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

- antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,
- aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ampril”.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ampril w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży, stosowanie leku Ampril może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersi”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ampril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego leku w tej grupie pacjentów nie zostały ustalone.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub istnieje co do tego wątpliwość), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ampril należy skontaktować się z lekarzem.

Ampril a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty (także lekach ziołowych). Lek Ampril może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Ampril.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregośkolwiek z poniższych leków, gdy mogą one osłabiać działanie leku Ampril:

- leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy);
 - leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz dokona oceny ciśnienia tętniczego.
- Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregośkolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko działania niepożądanego w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem Ampril:
- leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy);

- leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia);
- leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid;
- suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amilorid) i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom; trimetoprym i kotrimoksazol znany również jako trimetoprym/sulfametoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu);
- steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;
- allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi);
- prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca);
- wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2);
- racekadotryl (lek stosowany w leczeniu biegunki);
- leki, które są często stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do klasy inhibitorów mTOR). Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregośkolwiek z poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Ampril:

- leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina. Ampril może zmniejszać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Ampril należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.
- lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych). Ampril może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie uważnie kontrolować stężenie litu we krwi.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub istnieje co do tego wątpliwość), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ampril należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz prowadzący może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

- jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Ampril:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Ampril z jedzeniem i piciem

- Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Ampril może wywoływać zawroty głowy i uczucie „pustki” w głowie. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ampril należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ leki obniżające ciśnienie tętnicze i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.
- Ampril może być przyjmowany podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lek Ampril nie jest zalecany w pierwszych 12. tygodniach ciąży i nie może być przyjmowany po 13. tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli kobieta przyjmuje lek Ampril

zajdzie w ci???, powinna natychmiast powiedzie? o tym lekarzowi. Lekarz powinien przed zaj?ciem w ci??? zaleci? zmian? leczenia na inny, odpowiedni do stosowania lek.

Karmienie piersi?

Nie nale?y stosowa? leku Ampril w okresie karmienia piersi?.

Przed zastosowaniem ka?dego leku nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obs?ugiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ampril mo?e wyst?pi? senno?? lub zawroty g?owy. Prawdopodobie?stwo wyst?pienia takich objawów jest wi?ksze na pocz?tku przyjmowania leku Ampril oraz po zwi?kszeniu dawki. Je?eli wyst?pi senno?? lub zawroty g?owy, nie nale?y prowadzi? pojazdów ani u?ywa? narz?dzi i obs?ugiwa? maszyn.

Ampril zawiera laktoz? i sól Je?eli pacjent zosta? poinformowany przez lekarza, ?e stwierdzono u niego nietolerancj? niektórych cukrów, powinien zwróci? si? do lekarza przed przyj?ciem tego leku. Ten lek zawiera mniej ni? 1 mmol (23 mg) sodu na tabletk?, to znaczy lek uznaje si? za „wolny od sodu”.

3. Jak stosowa? lek Ampril

Ten lek nale?y zawsze stosowa? zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku

- Lek nale?y przyjmowa? doustnie, codziennie o tej samej porze.
- Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c p?ynem.
- Tabletek nie nale?y rozkrusza? ani gry??.

Dawkowanie

Leczenie nadci?nienia t?tniczego

- Zazwyczaj stosowana dawka pocz?tkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dob?.
- Lekarz b?dzie dostosowywa? dawk?, a? do uzyskania kontroli ci?nienia t?tniczego.
- Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dob?.
- W przypadku stosowania leków moczop?dnych (diuretyków), lekarz mo?e odstawi? b?d? zmniejszy? dawk? leku moczop?dnego przed rozpocz?ciem podawania leku Ampril.

Zmniejszenie ryzyka wyst?pienia zawa?u serca lub udaru mózgu

- Zazwyczaj stosowana dawka pocz?tkowa wynosi 2,5 mg raz na dob?.
- Lekarz mo?e zdecydowa? o zwi?kszeniu dawki.
- Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dob?.

Leczenie w celu zmniejszenia ryzyka lub opó?nienia pogorszenia czynno?ci nerek

- Zazwyczaj stosowana dawka pocz?tkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dob?.
- Lekarz dostosuje dawk? leku.
- Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dob?.

Leczenie niewydolno?ci serca

- Zazwyczaj stosowana dawka pocz?tkowa wynosi 1,25 mg raz na dob?.
- Lekarz dostosuje dawk? leku.
- Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dob?. Zaleca si? przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

- Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi od 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

- Lekarz dostosuje dawkę leku.

- Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

- Lekarz zaleci mniejszą dawkę początkową i będzie wolniej dostosowywał dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ampril

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawieszenie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Ampril

- W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

- Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ampril

Nie należy przerywać przyjmowania leku chyba, że tak zaleci lekarz. Nie należy przerywać przyjmowania leku Ampril tylko z powodu polepszenia stanu zdrowia. Przerwanie leczenia może spowodować nasilenie się nadciśnienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jakądy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W razie zauważenia któregośkolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku Ampril i natychmiast skontaktować się z lekarzem - może być konieczna pilna pomoc medyczna:

- Obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz śwید i wysypka.

Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na lek Ampril.

- Nasilone zmiany skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych zaburzeń należy natychmiast poinformować lekarza:

- Przyspieszona czynność serca, nierówne lub mocne bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca lub udar mózgu.

- Duszność lub kaszel. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc.

- Łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiegokolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakąszenia, ból gardła i gorączka, zmęczenie, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących krwi lub szpiku kostnego.

- Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.

- Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból głowy, nudności, zaczerwienienie skóry lub oczu (czerwoność). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub

uszkodzenie w?troby.

Inne dzia?ania niepo??dane

Nale?y poinformowa? lekarza, je?li którykolwiek z poni?szych objawów nasili si? lub utrzymuje si? d?u?ej ni? kilka dni.

Cz?ste dzia?ania niepo??dane (mog? wyst?pi? u nie wi?cej ni? 1 na 10 pacjentów):

- Ból g?owy lub uczucie zm?czenia.
- Zawroty g?owy. Prawdopodobie?stwo wyst?pienia jest wi?ksze na pocz?tku stosowania leku Ampril oraz po zwi?kszeniu dawki.
- Omdlenie, niedoci?nienie (nieprawid?owo niskie ci?nienie t?tnicze) wyst?puj?ce zw?aszcza po szybkiej zmianie pozycji z le??cej na siedz?c? lub stoj?c?.
- Suchy, m?cz?cy kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszno??.
- Ból ?o??dka lub brzucha, biegunka, niestrawno??, nudno?ci lub wymioty.
- Wysypka z wypuk?ymi zmianami skórnymi lub bez.
- Ból w klatce piersiowej.
- Kurcze lub ból mi??ni.
- Zwi?kszone st??enie potasu we krwi, stwierdzone w badaniach laboratoryjnych.

Niezbyt cz?ste dzia?ania niepo??dane (mog? wyst?pi? u nie wi?cej ni? 1 na 100 pacjentów):

- Zaburzenia równowagi (zawroty g?owy pochodzenia b??dnikowego).
 - ?wi?d skóry i nietypowe odczucia w obr?bie skóry, takie jak dr?twienie, mrowienie, k?ucie, pieczenie lub uczucie pe?zania po skórze (parestezje).
 - Utrata lub zaburzenia smaku.
 - Zaburzenia snu.
 - Depresja, l?k, nerwowo?? lub niepokój, zw?aszcza ruchowy.
 - Niedro?no?? nosa, trudno?ci w oddychaniu lub nasilenie astmy.
 - Obrz?k jelit nazywany „obrz?kiem naczyńioruchowym jelit”, którego objawami s? bóle brzucha, wymioty i biegunka.
 - Zgaga, zaparcie lub sucho?? b?ony ?luzowej jamy ustnej.
 - Wi?ksze ni? zwykle wydalanie moczu w ci?gu dnia.
 - Nasilone pocenie si?.
 - Utrata b?d? zmniejszenie apetytu (jad?owstr?t).
 - Przyspieszona lub nieregularna czynno?? serca. Obrz?k r?k i nóg. Mo?e by? objawem zatrzymania wi?kszych ni? zwykle ilo?ci wody w organizmie.
 - Uderzenia gor?ca.
 - Niewyra?ne widzenie.
 - Ból stawów.
 - Gor?czka.
 - Impotencja, zmniejszenie pop?du p?ciowego u m??czyzn lub kobiet.
 - Zwi?kszona liczba niektórych krwinek bia?ych (eozynofilia), stwierdzana w badaniach krwi.
 - Zaburzenia czynno?ci w?troby, trzustki lub nerek, stwierdzone w badaniach krwi.
- Rzadkie dzia?ania niepo??dane (mog? wyst?pi? u nie wi?cej ni? 1 na 1000 pacjentów):
- Uczucie niepewno?ci lub dezorientacji.
 - Zaczerwienienie i obrz?k j?zyka.
 - Ci??kie z?uszczanie si? skóry, sw?dz?ca grudkowa wysypka.

- Choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska).
 - Wysypka skórna lub siniaki.
 - Plamy na skórze i zimne kończyny.
 - Zaczzerwienienie, powiększenie, obrzęk lub zapalenie oczu.
 - Zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach.
 - Osłabienie.
 - Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny, stwierdzone w badaniach krwi.
- Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- Nadwrażliwość na światło słoneczne.
- Działania niepożądane o nieznanym częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zagęszczony mocz (ciemny kolor moczu), nudności, wymioty, kurcze mięśni, dezorientacja i drgawki; przyczyną tych objawów może być niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH); w razie wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Inne zgłaszane działania niepożądane:
- Należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni:
- Trudności w koncentracji.
 - Obrzęk ust.
 - Zbyt mała liczba krwinek, stwierdzana w badaniach krwi.
 - Zmniejszenie stężenia sodu, stwierdzone w badaniach krwi.
 - Zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda).
 - Powiększenie piersi u mężczyzn.
 - Spowolnione lub zaburzone reakcje.
 - Uczucie pieczenia.
 - Zaburzenia węchu.
 - Wypadanie włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działania Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ampril

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ampril

- Substancją czynną leku jest ramipryl.

Każda tabletka leku Ampril 2,5 mg tabletki zawiera 2,5 mg ramiprylu.

Każda tabletka leku Ampril 5 mg tabletki zawiera 5 mg ramiprylu.

Każda tabletka leku Ampril 10 mg tabletki zawiera 10 mg ramiprylu.

- Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroscarmeloza sodowa, skrobia żelowana kukurydziana (Starch 1500), sodu stearylofumaran; lek Ampril 2,5 mg tabletki zawiera również barwnik Blend PB 22960 Yellow: laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E 172); lek Ampril 5 mg tabletki zawiera również barwnik Blend PB 24877 Pink: laktoza jednowodna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172). Patrz punkt 2 „Ampril zawiera laktozę i sól”.

Jak wygląda lek Ampril i co zawiera opakowanie

Ampril 2,5 mg tabletki: białe, płaskie, podługowe tabletki o wymiarach 10,0 x 5,0 mm

Ampril 5 mg tabletki: różowe, płaskie, podługowe tabletki o wymiarach 8,8 x 4,4 mm

Ampril 10 mg tabletki: białe do białawych, płaskie, podługowe tabletki o wymiarach 11,0 x 5,5 mm

Opakowania: 30, 60, 90 lub 100 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.05.2019