

APIPULMOL syrop 120ml"



Cena: 11,62 zł

Opis produktu

Apipulmol
(2 g + 90 mg)/ 100 g
Sulfogaiacolum + Ammonii chloridum
Syrop, 120 ml
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Skład:

100g syropu zawiera 2 g sulfogwajakolu i 90 mg amonu chlorku
Substancje pomocnicze: ziołomiód sosnowy (zawiera sacharozę), etanol, metylu parahydroksybenzoesan.

Dawkowanie:

Dorośli: 3 lub 4 razy na dobę po 10 ml (1 łyżka stołowa), z małą ilością ciepłego płynu.

Działanie:

Apipulmol jest syropem przeznaczonym dla osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przesuwanie w oskrzelach poprzez aktywizację czynności rzęsek nabłonka migawkowego. Ziołomiód sosnowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu.

Wskazania:

Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na sulfogwajakol, chlorek amonu, produkty pszczele lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci.

Działania niepożądane:

Nie zaobserwowano ciężkich objawów niepożądanych. Zgłaszano pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie przeczyszczające) powinni odstawić lek i porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele.

Z powodu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania syropu Apipulmol na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty

Ciąża i karmienie piersią:

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w tym okresie.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina sp. z o.o.
Ul. Lipska 44
30-721 Kraków