

APITUSSIC syrop 120ml



Cena: 9,56 zł

Opis produktu

Apitussic
52 mg/5 ml
Sulfogaiacolum
Syrop, 120 ml
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Skład:

5 ml syropu zawiera 52 mg sulfogwajakolu.
Substancje pomocnicze: sodu benzoesan, ziołomiód sosnowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 3 lub 4 razy dziennie 5 ml (1 łyżeczka od herbaty)
Dzieci starsze i młodzież: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (2 łyżeczki od herbaty)
Dorośli: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (1 łyżka stołowa)

Działanie:

Apitussic jest syropem przeznaczonym dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające zalegającą wydzielinę w drzewie oskrzelowym. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przesuwanie w oskrzelach poprzez pobudzenie czynności rzęsek nabłonka migawkowego. Ziołomiód sosnowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu.

Wskazania:

Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

Unikać stosowania u osób z czynną chorobą wrzodową – produkt leczniczy może nasilać dolegliwości.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Działania niepożądane:

Nie obserwowano istotnych objawów niepożądanych.

Wystąpiły pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego.

Istnieje możliwość nadwrażliwości na składniki leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy- izomaltozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działania przeczyszczające) powinni odstawić produkt leczniczy i skontaktować się z lekarzem.

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. Nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele.

Ciąża i karmienie piersią:

Za względu na nierozpoznane ryzyko działań toksycznych, lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Interakcje:

W przypadku zastosowania syropu Apitussic na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmina sp. z o.o.

Ul. Lipska 44

30-721 Kraków