

ATOPIGO koncentrat do kąpiel 100g

Cena: 8,44 zł



Opis produktu

Zastosowanie:

Atopigo® jest koncentratem do przygotowywania kąpeli stosowanych w atopowym zapaleniu skóry. Działa profilaktycznie i łagodząco. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego, po uprzednim rozcieńczeniu wodą według przedstawionego poniżej sposobu postępowania z wyrobem. **Atopigo® można stosować od 3 miesiąca życia.**

Opis działania

Atopigo® zawiera podchloryn sodu. Kąpiele w rozcieńczonym podchlorynie sodu są rekomendowane jako bezpieczna metoda zapobiegania i łagodzenia objawów atopowego zapalenia skóry. Kąpiel z dodatkiem Atopigo® oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, które powodują nasilenie objawów atopowego zapalenia skóry. Systematyczne stosowanie kąpeli z dodatkiem Atopigo® przyczynia się do poprawy stanu skóry i jej większej odporności na zakażenia (bakteryjne, grzybicze i wirusowe).

Sposób postępowania z wyrobem

Kąpiel w wannie Przed pierwszym użyciem wyrobu należy ustalić poziom w wannie odpowiadający 100 litrom wody za pomocą naczynia o znanej pojemności.

KROK 1 Napełnij wannę 100 litrami letniej wody (o temperaturze około 37°C). Ostrożnie dodaj do wody całą zawartość butelki. Użyj rękawiczek ochronnych. Dokładnie wymieszaj zawartość wanny.

KROK 2 Zanurz ciało w przygotowanej kąpieli. Nie zanurzaj głowy. Czas trwania kąpieli: 10 minut.

KROK 3 Dokładnie opłucz ciało za pomocą letniej, bieżącej wody.

KROK 4 Delikatnie osusz ciało ręcznikiem. Nie pocieraj skóry.

KROK 5 Gdy skóra jest jeszcze lekko wilgotna, użyj leków stosowanych na skórę (jeżeli są przepisane przez lekarza) a następnie emolientu.

Powtarzać kąpiel 2 – 3 razy w tygodniu lub według zaleceń lekarza. *Kąpiel w wanience*

Należy odmierzyć miarką 5 mililitrów wyrobu na każde 5 litrów wody. Użyj rękawiczek ochronnych. Rozprowadzić wyrób dokładnie mieszając zawartość wanienki. Dalej postępować jak opisano powyżej (KROK 2 – 5).

Po każdorazowym użyciu wyrobu dokładnie zamykać opakowanie.

Warunki przechowywania

Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu. **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

Dopuszczalny jest transport w temperaturze otoczenia nie dłuższy niż 7 dni.

Przechowywać w temperaturze 2 – 8°C. W przypadku przechowywania wyrobu w temperaturze 2 – 8°C okres ważności nie ulega zmianie.

Podczas stosowania wyrób można przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Datę wyciążnięcia z lodówki należy zapisać na etykiecie butelki. Zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Chronić przed światłem słonecznym.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).