

BEBILON PROFUTURA DUO BIOTIK 1 800g

Cena: 81,75 zł



Opis produktu

BEBILON PROFUTURA DUO BIOTIK 1 800g

Opis
Bebilon Profutura Duo Biotik 1 to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jest mlekiem początkowym, dedykowanym dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia.
Mleko zostało opracowane w taki sposób, aby wspierać rozwój dziecka w momencie, gdy karmienie piersią nie jest możliwe. Może stanowić (podobnie jak wszystkie mleka początkowe) jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, od czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. Bebilon Profutura Duo Biotik 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.

UWAGA: Nowe opakowanie (Bebilon Duo Biotik) stopniowo będzie zastępować stare opakowanie. Mimo zmiany opakowania formuła mleka pozostaje bez zmian. Opakowania w starej szacie graficznej będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Skład
Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,95 %), olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, białko serwatkowe w proszku z mleka, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,77 %), fruktooligosacharydy FOS (0,62 %), olej rybi, wapń, olej z Mortierella alpina, potas, sód, chlorek choliny, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, kwas adenozy-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozy-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozy-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, L-tryptofan, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, selen, mangan, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Składnik	Wartość energetyczna w 100 ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna	276 kJ / 66 kcal

Tłuszcz, w tym:	3,4 g
kwasy tłuszczowe nasycone	1,7 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,1 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,6 g
kwas linolowy (LA)	448 mg
kwas α-linolenowy (ALA)	54,9 mg
kwas arachidonowy (AA)	16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,5 mg
Węglowodany, w tym:	7,3 g
cukry	7,2 g
laktoza	7,0 g
Błonnik, w tym oligosacharydy:	0,7 g
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
2'-FL (2'-fukozylolaktoza)	0,10 g
3'GL (3' -galaktozylolaktoza)	0,015 g
Białko	1,3 g
L-karnityna	2,1 mg
Witaminy	
Witamina A	58 µg
Witamina D	1,4 µg
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	4,5 µg
Witamina C	9,3 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,049 mg
Kwas foliowy	8,3 µg
Witamina B12	0,17 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,54 mg
Składniki mineralne	
Sód	21,9 mg
Potas	74 mg
Chlorek	52 mg
Wapń	60 mg
Fosfor	41 mg
Magnez	5,4 mg
Żelazo	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,053 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	≤0,006 mg
Selen	3,0 µg
Jod	13 µg

Inne	
Cholina	22 mg
Nukleotydy	2,3 mg
Inozytol	7,3 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g

Opakowanie Bebilon Profutura Duo Biotik 1 pozwala na przygotowanie 57 porcji mleka o pojemności 100 ml.

Zawiera: ryby, mleko, soję.

Masa netto

800 g

Właściwości

Zgodnie z zasadami prawa dotyczącymi wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt, produkt zawiera DHA, a jego formuła jest kompletna odżywczo by już od pierwszych chwil zaspokajać potrzeby żywieniowe dziecka.

Zalecane dzienne spożycie

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Ilość wody na porcję	Liczba płaskich miarek na porcję
1. miesiąc	7	90-120 ml	3-4
2-3. miesiąc	6	120 ml	4
4. miesiąc	6	150 ml	5
5-6. miesiąc	4	180 ml	6

Podane wartości należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.

100 ml gotowego preparatu Bebilon Profutura Duo Biotik 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miarki.

1 płaska miarka to 4,6 g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon Profutura Duo Biotik 1 na Bebilon Profutura Duo Biotik 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon Profutura Duo Biotik 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon Profutura Duo Biotik 2.

Sposób użycia

Nieodpowiednie przygotowanie i przechowywanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.

Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu w celu odmierzenia odpowiedniej ilości wody.

Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.

Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon Profutura Duo Biotik. W tym celu używaj wyłącznie załączonej miareczki, przestrzegając wartości zamieszczonych w tabeli żywienia.

Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.

Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Umyj butelkę i smoczek zaraz po nakarmieniu dziecka.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest przystosowany dla niemowląt od urodzenia, jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą być one karmione piersią. Produkt nadaje się jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Aby zachować najwyższą jakość i właściwości produktu należy przechowywać produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chroniąc od źródeł światła i wilgoci. Nie przechowywać produktu w lodówce.

Produkt należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu opakowania. Nie zaleca się przesypywania preparatu do innych pojemników. Z uwagi na ważne informacje znajdujące się na oryginalnym opakowaniu, powinno być one wyrzucone wyłącznie po wykorzystaniu jego zawartości.

Mleko Bebilon Profutura Duo Biotik 1 należy przygotowywać zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystać w przeciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. Zaleca się wylanie niewypitej porcji bezpośrednio po skończonym posiłku. Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej

do opakowania. Nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka.

Ważnym jest, aby po zakończonym karmieniu dopilnować, aby dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z pozostałością pokarmu. Należy również zwrócić uwagę na utrzymanie prawidłowej higieny pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Nie gotować ani nie podgrzewać produktu w kuchence mikrofalowej, gdyż grozi to oparzeniem.

Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa