


BISACODYL VP tabl.powl.0,005g *30



Cena: 14,05 zł

Opis produktu

Bisacodyl VP, 5mg, tabletki dojelitowe

Produkt leczniczy

PRZYNOSI ULGĘ W ZAPARCIACH

Nazwa produktu leczniczego: Bisacodyl vp, 5 mg, tabletki dojelitowe.

Substancja czynna: Jedna tabletki dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu (bisacodylum).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: doustnie, 1-2 tabletki na noc.

Dzieci w wieku 4-10 lat: doustnie, 1 tabletki na noc.

U osób w wieku podeszłym, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki. Preparat należy połyknąć w całości i obficie popić wodą, nie rozgryzać ani nie rozkruszać.

Wskazania do stosowania: Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne). Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopia, cholecystografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zespół ostrego brzucha (między innymi niedrożności jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężkie odwodnienie.

Lek dostępny w aptece bez recepty

Ostrzeżenie: Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i

dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Bisacodyl VP może wchodzić w interakcje z:

- lekami zobojętniającymi sok żołądkowy,
- glikozydami naparstnicy,
- lekami moczopędnymi,
- kortykosteroidami.