

CETALERGIN Ten 10mg * 10 tabletek powlekanych

Cena: 6,11 zł



Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Skład

Jedna tabletki powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru (Cetirizini dihydrochloridum) oraz 66,4 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka alergicznego całorocznego i sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa oraz alergicznego zapalenia spojówek. Leczenie przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Działanie

Preparat wykazuje działanie przeciwalergiczne.

Dawkowanie

Lek należy przyjmować doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu jeżeli pacjent wykazuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Nie można także stosować leku jeżeli u chorego występuje ciężka niewydolność nerek. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią. Preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Dodatkowe

Stosowanie preparatu należy przerwać na około 3 dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Należy unikać przyjmowania leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić jak reagują na cetyryzynę, ponieważ u niektórych osób mogą pojawić się działania niepożądane (np. senność, niewyraźne widzenie), które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń/maszyn.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie są spodziewane interakcje tego produktu leczniczego z innymi lekami. W przeprowadzonych badaniach nie donoszono o wystąpieniu interakcji farmakodynamicznych ani znaczących interakcji farmakokinetycznych, w szczególności z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg na dobę). Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów