

CEVITT GARDŁO TABL. DO SSANIA CYTRYNA *20

Cena: 31,77 zł



Opis produktu

Opis:

Zastosowanie:

Cevitt Gardło to wyrób medyczny w postaci tabletek do ssania. Produkt stosowany w przypadku podrażnień wywołujących kaszel, podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz związanym z nimi bólem gardła, utrudnionym przełykaniem oraz chrypka. Podczas ssania tabletek Cevitt Gardło po połączeniu ze śliną w ustach tworzy się hydrożel. Pokrywa on w formie warstwy ochronnej podrażnioną błonę śluzową jamy ustnej i gardła umożliwiając jej regenerację oraz uśmierzając ból gardła, trudności w przełykaniu i objawy chrypki.

Właściwości:

Cevitt Gardło tabletki do ssania:

- nawilżają
- chronią błonę śluzową gardła
- łagodzą dolegliwości związane z stanem zapalnym

Działanie:

Tabletki Cevitt® Gardło nawilżają i chronią błonę śluzową gardła oraz łagodzą dolegliwości związane z wysuszeniem czy stanem zapalnym, infekcją gardła, mają pyszny cytrynowy smak.

Skład:

karbomer, ksantan, hialuronian sodu, mannitol, wodorowęglan sodu, sorbitol, kwas cytrynowy, aspartam, witamina C, aromat, cytrynian cynku dwuwodny.

Dzięki obecności substancji pomocniczych witaminy C i dwuwodnego cytrynianu cynku 1 tabletkę Cevitt Gardło zawiera 1,5 mg cynku i 12,00 mg witaminy C.

Sposób użycia:

Dzieci w wieku od 6. do 10. lat: należy powoli ssać 1 tabletkę co 4-5 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki dziennie;
Dorośli i dzieci powyżej 10. roku życia: należy powoli ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek dziennie.

Przeciwwskazania:

- uczulenie na którykolwiek składnik preparatu,
- w przypadku znacząco ograniczonego wytwarzania śliny, np. w przypadku syndromu Sjögrena,
- jeśli pacjent choruje na fenylketonurię, ze względu na to, że tabletki zawierają aspartam stanowiący źródło fenylalaniny.

Cevitt Gardło a inne preparaty, w tym leki.

Cevitt Gardło powoduje tworzenie się warstwy hydrożelu, co może opóźnić resorpcję innych leków. Ze względu na cynk zawarty w Cevitt Gardło może również dojść do obniżenia ich skuteczności. Z tego względu między przyjęciem tabletek Cevitt Gardło oraz innych preparatów należy zachować odstęp 3 godzin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Tabletki do ssania Cevitt Gardło zawierają sorbitol. Przed rozpoczęciem stosowania należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, w przypadku gdy pacjent nie toleruje określonych cukrów.

Tabletek do ssania Cevitt Gardło nie powinno się rozgryzać ani połykać w całości.

Nadmierne stosowanie tabletek do ssania Cevitt Gardło może doprowadzić do rozrzedzenia się stolca i działać przeczyszczająco.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek dziennie.

Dystrybutor

Alpen Pharma Polska Sp. z o.o.