

CRATONIC tabletki *30 sztuk

Cena: 11,89 zł



Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	Wrocławskie Zakłady Zielarskie ""Herbapol"" S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Lek Cratonic to tabletki powlekane dla osób dorosłych. Ich głównym składnikiem jest wyciąg gęsty z kwiatostanu głogu, który zwiększa przepływ krwi w naczyniach wieńcowych oraz siłę skurczu mięśnia sercowego i poprawia jego pracę.

Lek Cratonic zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego, dzięki czemu poprawia jego pracę. Produkt działa także na krążenie wieńcowe poprzez zwiększenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe.

Skład

Substancja czynna: wyciąg gęsty z kwiatostanu głogu (Crataegi folii cum flore extractum spissum) (5-6,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (v/v).

1 tabletkę powlekana zawiera 124,8 mg wyciągu gęstego z kwiatostanu głogu.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, sól sodowa karboksymetyloskrobi, stearynian magnezu, powidon, Aqua Polish blue 060.13, hypromeloza, talk, migliol 812, dwutlenek tytanu E171, indygotyna E132, błękit brylantowy E133, żółcień chinolinowa E104.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 3 razy dziennie po 2 tabletki.
Produkt leczniczy należy przyjmować systematycznie przynajmniej przez 4-6 tygodni.

Wskazania

Lek Cratonic wskazany jest wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca (I° i II° wg NYHA), która nie wymaga stosowania innych leków i nie towarzyszą jej objawy zastoiny krążenia. Wskazaniem do stosowania jest również osłabienie mięśnia sercowego u osób w wieku podeszłym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie odnotowano żadnych działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli po upływie 6 tygodni od rozpoczęcia stosowania leku objawy nie ustępują, wystąpiło gromadzenie się płynów (w postaci obrzęku nóg) lub pojawiły się następujące objawy: ból w okolicy serca rozszerzający się w kierunku ramienia, ból w górnej części jamy brzusznej, ból okolicy szyi i duszności należy zgłosić się do lekarza.
- Lek zawiera laktozę, pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów przed użyciem powinni skonsultować się z lekarzem.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Zaleca się zachować szczególną ostrożność przy równoczesnym stosowaniu leku Cratonic i innych leków stosowanych w niewydolności serca, leków hipotensyjnych, ponieważ ich działanie może ulec spotęgowaniu.