

DESDERMAN PURE PŁYN 1L do higieny i dezynfekcji rąk

Cena: 100,00 zł



Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SCHULKE & MAYR GMBH
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Biobójcze

Opis produktu

Zalety:

- działa ochronnie i pielęgnująco na skórę dzięki właściwościom natłuszczającym i nawilżającym
- zapobiega wysuszaniu rąk i utrzymuje elastyczność skóry
- nie zawiera barwników i substancji zapachowych, może być stosowany przez alergików
- przebadany pod względem dermatologicznym

Zastosowanie:

desderman® pure stosuje się do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach związanych z ochroną zdrowia.

Właściwości:

desderman® pure posiada właściwości bakteriobójcze, bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych i wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV, herpes simplex viruses, rota, noro, adeno, polio, vaccinia i SARS.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Preparat należy stosować bez rozcieńczenia bezpośrednio na skórę rąk.

- Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 30 sekund (3ml)
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 2 x 5ml (łącznie: 10ml) w czasie 90 sek.
- Mycobacterium tuberculosis - 30 sek.
- wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV - 30 sek.
- vaccinia - 30 sek.
- poliovirusy (z obciążeniem) - 3 min.
- poliovirusy (bez obciążenia) - 1 min.
- adenowirusy - 15 sek.
- rotawirusy - 30 sek.

- herpes simplex viruses - 30 sek.
- norowirusy (testowane na Murine Noro-Virus) - 15 sek.
- SARS - 30 sek.

Dane produktu:

Substancje czynne:

Etanol (96%) - 78,2 g/100g roztworu

Bifenyl-2-ol - 0,1 g/100g roztworu

Dane chemiczno-fizyczne

Temperatura zapłonu: 16 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Forma: ciecz

Tarcie, dynamiczne: nie określono

Gęstość: ok. 0,83 g/cm³ / 20 °C

Kolor: bezbarwny

pH: 4,5 - 7,5 / 100 % / 20 °C

Ostrzeżenia:

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: typowe skutki uboczne stosowania alkoholowych środków do dezynfekcji rąk takie jak podrażnienie skóry (np. zaczerwienienie, suchość) mogą wystąpić sporadycznie. Takie objawy ustępują zwykle po 8-10 dniach mimo dalszego używania środka. Uczulenie kontaktowe lub reakcje fotouczulające mogą wystąpić w bardzo rzadkich przypadkach. W przypadku kontaktu z oczami, płukać natychmiast dużą ilością wody oraz zasięgnąć porady lekarza

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać powyżej 25 st.C. Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Chronić przed wysoką temperaturą i działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.

Termin ważności: 5 lat

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4363/11.