

GlucCare - tabletki 30 tabl.

Cena: 31,96 zł



Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	STADA POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

Opis produktu

GlucCare

Ekstrakt z liści Banaba zawiera w swoim składzie kwas korosolowy oraz taniny. Kora Berberysu ostrego zawiera berberynę, która przyczynia się do poprawy kontroli glukozy we krwi. Chrom jest pierwiastkiem śladowym, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Więcej informacji

Zastosowanie:

Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie.

Zalecana dzienna porcja do spożycia w celu uzyskania korzystnego efektu:

Osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia): 1 tabletkę na dobę w trakcie lub bezpośrednio po kolacji.

Składniki:

500mg berberyny (526mg ekstraktu standaryzowanego do 95% berberyny); 48mg ekstraktu z liści Banaba standaryzowanego do 1% kwasu korosolowego; 0,75mg pikolinianu chromu, w tym 90mcg chromu; substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna E460, fosforan trójwapniowy E341, hydroksypropylometyloceluloza E464, polidekstroza E1200, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym E472a/ substancje przeciwzbrylające: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana E468, dwutlenek krzemu E551/ substancja wiążąca: powidon E1201/ barwnik: dwutlenek tytanu E171, tlenek żelaza żółty E172iii/ substancja glazurująca: stearynian magnezu E470b, talk E553b, olej kokosowy, szelak E904.

1 tabletkę zawiera: 500mg berberyny (526mg ekstraktu standaryzowanego do 95% berberyny); 48mg ekstraktu z liści Banaba standaryzowanego do 1% kwasu korosolowego; 0,75mg pikolinianu chromu, w tym 90mcg (225%*) chromu.

Ostrzeżenia:

Nie stosować w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Produkt nie powinien być przyjmowany bez kontroli lekarza razem z innymi doustnymi produktami stosowanymi w zaburzonej metabolizmie węglowodanów. Nie przyjmować razem z cyklosporyną, antykoagulantami, lewodopą (L-DOPA) oraz lewotyroksyną (L-thyroxine). Suplement diety nie powinien być stosowany przez pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Jednoczesne stosowanie leków alkalinizujących może powodować zmniejszone wchłanianie chromu.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są istotne.

Podmiot odpowiedzialny

Stada Poland Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa