

Liv 52 - tabletki 50 tabl.

Cena: 15,52 zł



Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	World Markets Sp. z o.o.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Liv.52 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Liv.52
3. Jak stosować lek Liv.52

4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Liv.52
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Liv.52 i w jakim celu się go stosuje

Liv.52 jest lekiem ziołowo-mineralnym w postaci tabletek, stosowanym wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby i w stanach rekonwalescencji.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z długiego okresu stosowania.

Liv.52 pobudza czynność wydzielniczą wątroby, pobudza wydzielanie żółci (działa choleretycznie), co daje ochronny wpływ na wątrobę, zmniejszając objawy infekcji bakteryjnych, wirusowych i wpływu substancji szkodliwych takich jak: leki (np. antybiotyki, leki przeciwgruźlicze), środki chemiczne (np. związki metali) i alkohol.

Mechanizm ochronnego działania Liv.52 na wątrobę tłumaczy się:

- przyspieszeniem wydalania z żółcią szkodliwych substancji i metabolitów,
- zmniejszeniem utleniania lipidów i tworzenia się wolnych rodników.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Liv.52

Kiedy nie stosować Liv.52

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Astraceae, dawniej Compositae, złożonych) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Liv.52 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- w razie podejrzenia wystąpienia żółtaczk (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub żółtce białkówki gałki ocznej), przed zastosowaniem leku, należy zgłosić się do lekarza.
- jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania leku lub występują działania niepożądane, niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

Liv.52 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono występowania interakcji farmakodynamicznych Liv.52 z innymi lekami.

Zaobserwowano obniżanie stężenia ibuprofenu w surowicy krwi podczas równoczesnego stosowania z tabletkami Liv.52, bez istotnej zmiany jego biodostępności.

Stosowanie leku Liv.52 z jedzeniem i piciem i alkoholem

Tabletki należy stosować pół godziny przed posiłkiem.

Podczas leczenia i po jego zakończeniu należy w miarę możliwości unikać środków toksycznych dla wątroby, takich jak np. alkohol etylowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie jest zalecane stosowanie leku bez konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować Liv.52

Liv.52 należy stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować doustnie. Tabletki należy połykać pół godziny przed posiłkiem.

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka to:

- wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 do 4 razy na dobę.
- wspomagająco w stanach po zatruciach lekami od 1 do 2 tabletek, 2 razy na dobę .
- w alkoholowych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 razy na dobę
- w okresie rekonwalescencji 2 tabletki 2 razy na dobę..

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: zalecana dawka leku u młodzieży to 1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Liv.52

Zarówno w badaniach przedklinicznych przeprowadzonych na zwierzętach jak i w badaniach klinicznych u ludzi, nie stwierdzono objawów przedawkowania leku

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nie stwierdzono objawów niepożądanych spowodowanych przyjmowaniem leku Liv.52.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Liv.52

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego produktu leczniczego po upływie terminu ważności podanego na pudełku i pojemniku po: „termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Liv.52

Substancjami czynnymi leku są: Capparis spinosae cortex 65 mg, Cichorii intybus semen 65 mg, Solani nigri herba 32 mg, Terminaliae arjunae cortex 32 mg, Cassiae occidentalis semen 16 mg, Achilleae millefolii semen 16 mg, Tamarix gallicae herba 16 mg, Mandur Bhasma (zawartość żelaza Fe+2 i Fe+3 w ilości 3 mg) 33 mg.

Pozostałe składniki to: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu koloidalny, celuloza mikrokryształiczna, kroscarmeloza sodowa i karboksymetyloceluloza sodowa.

Jak wygląda lek Liv.52 i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku stanowią białe polietylenowe (HDPE) pojemniki zabezpieczone folią aluminiową, z zielonymi zakrętkami PP, umieszczone w kartonowych pudełkach. Butelki zawierają po 50 i 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

World Markets Sp. z o.o.
ul.Olecka 23, 04-980 Warszawa
Tel./faks: (22) 872 04 11
Importer
World Markets Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10, 20-218 Lublin