

SUPLASYN INJ. 0,02 G/2ml 1 amp.-strz.

Cena: 95,70 zł



Opis produktu

Suplasyn zalecany jest w objawowym **leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów**. Zadaniem **zastrzyku z kwasem hialuronowym** jest poprawa funkcjonowania stawów, ochrona stawów oraz regeneracja chrząstki stawowej. **Suplasyn** podaje się bezpośrednio do stawów dotkniętych chorobą zwyrodnieniową, np. staw kolanowy, staw biodrowy.

Zastrzyki dostawowe Suplasyn:

- Poprawiają ruchomość stawów
- Poprawiają właściwości amortyzujące stawów
- Opóźniają proces degeneracji chrząstki stawowej
- Zwiększają ilość substancji smarujących
- Poprawiają lepkość i elastyczność płynu dostawowego
- Wspomagają odbudowę stawów
- Łagodzą ból związany z chorobą zwyrodnieniową

Suplasyn – dawkowanie

Dostawowo 1 wstrzyknięcie na tydzień przez 3-6 tygodni.

Suplasyn – jak często powtarzać zastrzyki kwasu hialuronowego?

Zazwyczaj zalecane jest podanie 3-6 zastrzyków w odstępach tygodniowych. O ilości podanych zastrzyków decyduje lekarz.

Suplasyn – skład

1 ampułkostrzykawka Suplasyn 2 ml zawiera:

- Kwas hialuronowy 20 mg/2ml
- Substancje pomocnicze

Zastrzyk w kolano?

Suplasyn może być podawany **do wszystkich stawów** objętych chorobą zwyrodnieniową, np. staw kolanowy, staw biodrowy, staw ramienny, staw w nadgarstku, staw skokowy. Najczęściej **zastrzyk Suplasyn** stosowany jest do stawu kolanowego.

Czy po zastrzyku w kolano można chodzić?

Po podaniu **zastrzyku z kwasem hialuronowym w kolano** zalecany jest odpoczynek i unikanie intensywnego wysiłku fizycznego przez 1-2 dni. Chodzisz możesz, ale nie można się forsować

Podmiot odpowiedzialny

Stada Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 44,
02-255 Warszawa
Poland